

Piège à phéromones Mineuse de la tomate

Capture les papillons mâles
de la mineuse de la tomate



PIÈGE À EAU

Capture par noyade pour
une excellente efficacité.



GRANDE CAPACITÉ

Environ 3,5 litres.



RÉUTILISABLE

Plusieurs saisons.



ROBUSTE

Plastique résistant aux UV
et aux intempéries.



**À utiliser avec
une phéromone**

SOLU.FR
TOUTPOURLESNUISIBLES.COM
PENNTYBIO.COM

Traiter juste. protéger mieux

K3D SARL - 04 74 05 25 56

31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay
Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399

info@solu.fr

Les **mineuses de la tomate** (*Tuta absoluta*) sont des insectes nuisibles qui représentent une menace pour les cultures de tomates à travers le monde. Elles sont reconnaissables par plusieurs caractéristiques. Ce sont de petits papillons d'environ 7 mm d'envergure. Leur apparence peut varier, mais en général, ils ont des ailes jaunes ou brunes avec des taches sombres.

Pour lutter contre la propagation de la mineuse du marronnier, une méthode écologique et efficace est l'utilisation de capsules de phéromone. Ces capsules imitent les phéromones sexuelles émises par les femelles du papillon, attirant ainsi les mâles dans un piège. Cette méthode de lutte biologique permet de réduire la population de mineuses sans recourir à des pesticides chimiques, qui peuvent être nocifs pour l'environnement et d'autres organismes.

Composition du piège

1

PLATEAU
(PIÈGE À EAU)



5 cm

34 cm
DIAMÈTRE

2

PANIER
PORTE-PHÉROMONE



Attention : Piège livré sans phéromone

Comment utiliser les phéromones pour lutter contre les papillons de la mineuse de la tomate ?

Identifier le problème

Dommages aux feuilles : Les premiers signes d'infestation par la mineuse de la tomate incluent des sillons ou des galeries irrégulières à l'intérieur des feuilles, causés par les larves qui mangent le tissu foliaire de l'intérieur. Ces dommages peuvent réduire la capacité de la plante à photosynthétiser et, dans les cas sévères, entraîner le flétrissement ou la mort des feuilles.

Présence de larves : Les larves de la mineuse de la tomate sont petites, de couleur crème à jaune-vert, avec une tête plus foncée. Elles peuvent être difficiles à repérer sans ouvrir les galeries qu'elles créent dans les feuilles, les tiges, et parfois même les fruits.

Déjections : Les larves laissent derrière elles des déjections fines et foncées, souvent visibles à l'entrée des galeries qu'elles creusent. La présence de ces excréments peut aider à localiser les zones d'activité des larves.

Présence de papillons : Les adultes sont de petits papillons de nuit, généralement de couleur grise ou brunâtre, avec des ailes aux motifs subtils. Ils sont souvent actifs au crépuscule et au début de la nuit. La femelle dépose ses œufs sur les parties tendres de la plante, donnant naissance à de nouvelles générations de larves qui continueront à causer des dommages.

Accessoires pour l'utilisation du piège

Attention il est obligatoire de placer la phéromone dans un piège de type Watertrap

Attention : le piège est vendu seul

Période de piégeage de la mineuse de la tomate

Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Jui	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec

Mode d'emploi du piège Water Trap à utiliser avec une phéromone (vendue séparément)



Placez la capsule de phéromones dans le panier à phéromone.



Placez le panier dans le piège en alignant la tige inférieure du panier sur l'un des trous du support central du piège en appuyant soigneusement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Remplissez le plateau du piège avec de l'eau en laissant environ 2 centimètres jusqu'au bord.



Placez le piège sur le sol à proximité des plants de tomates.